No. 56. 1884.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Meeresconchylien
aus dem palaearctischen Faunengebiete.
Zweite Abtheilung.

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.
Clavagella	
melitensis Brod.	10,—
Gastrochaena	
dubia Penn.	0,40-80
Teredo	
malleolus Turt.	0,50-1
megotara F. et H.	0,50-1,20
navalis L.	0,50-1
norwegica Spengl.	0,50-1
Xylophaga	
dorsalis Turt.	0,50-3
Pholas	
candida L.	0,50-80
crispata L.	0,50-1,50
dactylus L.	0,50-1
parva Penn.	0,50-80
Solen	
americanus Gld.	0,50-1,50
ensis L.	0,20-40
siliqua L.	0,20-50
vagina L.	0,20-50
Cultellus	
pellucidus Penn.	0,30-50
Machaera	
costata Gould	0,40-1
media Gray	0,50-1
patula Dixon	1,50
Ceratisolen	
legumen L.	0,20-50
Solecurtus	
candidus Reen.	0,30-60
coarctatus Gm.	0,40-60
strigillatus L.	0,30-80
Saxicava	
arctica L.	0,20-40
Panopaea	
arctica Lm. (norveg.)	8—20
Glycimeris	
siliqua Spengl.	1-2,50
Mya	
arenaria L.	0,20-1
truncata L.	0,30-1
Platyodon	
cancellata Conr.	1,80-1,20
Corbulomya	
mediterranea Phil.	0,20-30
ovata Forb.	0,80-1,20

	Mk.
Corbula	
gibba Olivi	0,10-30
var. rosea Brown.	0,20-30
Neaera	
costellata Desh.	1,50-1
cuspidata Olivi	0,50-2
lamellosa Sars	0,80-1,20
obesa Lovén	0,50-1
rostrata Spengl.	0,50-1,50
Poromya	
granulata Nyst.	1—2
Pandora	
inaequivalvis L.	0,20-40
var. obtusa	0,30-50
trilineata Say	0,40-60
Lyonsia	
arenosa Möll.	0,50-1,50
corruscans Sc.	1-1,20
nitida Gould	0,60-80
Thracia	
corbuloides Desh.	0,50-1,50
distorta Mtg.	0,50-1,20
papyracea Poli	0,50-1
var. villosiuscula	0,50-80
praetenuis Pult.	0,30-60
truncata Bean.	0,50-2
Lutraria	
elliptica Lm.	0,50-1,50
oblonga Chm.	0,50-1,50
Mactra	
helvacea Chm.	1—2
lateralis Say	0,30-50
ovalis Gould	1,20
stultorum L.	0,20-40
var. lactea Gm.	0,20-1
subtruncata Mtg.	0,20-30
var. triangula Ren.	0,20-30
solida L.	0,20-60
var. elliptica Brown.	0,20-40
Mesodesma	
cornea Poli	0,20-30
Ceronia	
arctata Conr.	0,30-60
deaurata Turton	0,40-60
Syndosmya	
alba Wood.	0,20-30
intermedia Thomps.	0,20-30
ovata Phil.	0,40-50

	Mk.
prismatica Mtg.	0,20-40
tenuis Mtg.	0,20-30
Scrobicularia	
Cottardi Payr.	0,40-60
plana D. C.	0,20-50
Capsa	
fragilis L.	0,20-30
Donax	
politus Poli	0,30-40
semistriatus Poli	0,30-40
trunculus L.	0,10-20
var. anatinus Lam.	0,20
vittatus Jeffr.	0,20-40
Psammobia	
costulata Turt.	0,40-60
faroënsis Chm.	0,40-60
tellinella Lm.	0,30-40
var. purpurea	0,50-60
var. pura	0,50-60
vespertina Chm.	0,30-1
var. florida Lam.	0-50,60
Tellina	
alternidentata B. & S.	2,—
balaustina L.	0,20-40
baltica L.	0,10-20
var. attenuata Jeffr.	0,10-20
calcarea Chem.	0,20-60
crassa Penn.	0,20-40
cumana Costa	0,20-30
donacina L.	0,20-30
distorta Poli	0,40-60
exigua Poli	0,10-20
fabula Gm.	0,10-20
fusca Gould.	0,20-40
incarnata L.	0,10-30
iridescens Sow.	0,80
nitida Poli	0,10-20
planata L.	0,20-30
pusilla Phil.	0,30-40
pulchella Lm.	0,20-40
serrata Ren.	0,50-1,20
tenera Say	0,30-40
Petricola	
lithophaga Reclz.	0,20-50
pholadiformis Lm.	1—2
Venerupis	
irus L.	0,10
Lajonkairi Payr.	0,30-40
Lucinopsis	
undata Penn.	0,20-60
Cypricardia	
lithophagella Lm.	0,40-80
Cyanium	
antarcticum Phil.	0,60
minutum Fabr.	0,10-20
occidentalis Dall.	0,30-50
Tapes	
aureas Gm.	0,20-30

	Mk.
decussata L.	0,10-30
edulis Chm.	0,10-30
geographica Gm.	0,10-30
laeta Poli	0,10-30
var. bicolor	0,10-30
pullastra Mtg.	0,20-50
straminea Conr.	0,80-2
Venus	
casina L.	0,30-1
cygnea Ben.	2,—
fasciata Don.	0,10-40
fluctuosa Gld.	0,50-1
gallina L.	0,10-20
var. striatula D. C.	0,10-30
ovata Penn.	0,10-30
verrucosa L.	0,30-60
Cytherea	
chione L.	0,60-1,20
convexa Say	0,50-1
mercenaria L.	0,50-1
rudis Poli	0,40-1
Artemis	
exoleta L.	0,20-40
lincta Pult.	0,50-1
lupinus Poli	0,20-30
Circe	
minima Mtg.	0,20-30
Astarte	
borealis Chm.	0,50-1,50
var. placenta Mörch.	1,50
compressa Mtg.	0,20-40
castanea Say	0,50-1,50
crebricostata Forb.	0,50-1,50
fusca Poli	0,30-40
globosa Möll.	0,50-80
pulchella Jonas	1—2
sulcata D. C.	0,40-60
var. elliptica (species)	1,—
triangularis Mtg.	0,30-40
undata Gld.	1—2
Woodia	
digitaria L.	0,50-1,50
Cyprina	
islandica L.	0,40-1
Isocardia	
cor L.	1—2
Kelliella	
abyssicola Forb.	0,10-20
Cardium	
aculeatum L.	0,50-1
Deshayesi Payr.	0,50-1,50
erinaceum Lm.	1—2
echinatum Lm.	0,30-80
exiguum Gm.	0,20-30
edule L.	0,10-20
var. maxima	0,50
elegantulum Möller	1,—

	Mk.
fasciatum Mtg.	0,20-30
groenlandicum Chm.	1—3
hians Brochi	4—8
islandicum Chm.	1—3
minimum Phil.	0,10-20
nodosum Turt.	0,20-30
norwegicum Spengl.	0,20-80
oblongum Chm.	0,40-80
paucicostatum Sow.	0,30-1
papillosum Poli	0,20-30
parvum Phil.	0,20-30
pinnulatum Conr.	0,40-60
tuberculatum L.	0,20-60
Liocardium	
Mortoni Conr.	0,40-60
Chama	
gryphoides L.	0,20-50
sinistrorsa Brug.	0,40-80
Cardita	
antiquata Poli	0,20-60
aculeata „	0,20-40
borealis Conr.	0,50-1,50
calyculata L.	0,20-30
corbis Phil.	0,50
trapezia L.	0,30-60
Diplodonta	
rotundata Mtg.	0,20-80
Lucina	
borealis L.	0,30-1,50
divaricatus L.	0,20-50
lacteus L.	0,20-30
reticulata Poli	0,10-30
spinifera Mtg.	0,20-60
tenuisculpta Carp.	0,40-80
Axinus	
croulinensis Jeffr.	0,20-30
eumyarius Sars	0,60-80
ferruginosus Forb.	10—30
flexuosus Mtg.	0,10-50
Gouldi Phil.	0,40-60
Sarsi Phil.	0,20-50
Bornia	
corbuloides Phil.	0,20-30
Kellia	
suborbicularis Mtg.	0,30-50
Poronia	
rubra Mtg.	0,20-30
Montacuta	
bidentata Mtg.	0,20-50
Dawsoni Jeffr.	0,20-30
ferruginosa Mtg.	0,20-50
Maltzani Verkr.	0,60-80
Mölleri Holb.	0,30-1
substriata Mtg.	0,40-60
Galeoma	
Turtoni Sow.	0,80-1,20
Solenomya	
togata Poli	0,80-1,50

	Mk.
Limopsis	
minuta Phil.	1,50-3
Pectunculus	
bimaculatus Poli	0,50-1,50
glycimeris L.	0,20-80
insubricus Broc.	0,20-50
Arca	
barbata L.	0,20-80
clathrata Lm.	0,40-60
imbricata Poli	0,40-50
lactea L.	0,10-20
Noae L.	0,20-1
nodulosa Müller	0,40-1
scabra Poli	0,50-80
tetragona Poli	0,40-80
transversa Say	0,30-80
Cucullaea	
pectunculoides Sc.	0,30-1
Nucula	
delphinodonta Migh.	0,20-40
lenticula Möller	0,80-1
nucleus L.	0,20-30
var. radiata Hanl.	0,30-40
nitida Sow.	0,20-40
proxima Say	0,20-30
sulcata Bronn.	0,20-40
tenuis Mtg.	0,20-40
var. expansa Tor.	0,40-80
tumidula Malm.	0,20-40
Yoldia	
hyberborea Lov.	1—2
intermedia Sars	3,—
lucida Lov.	0,30-60
nana Sars = L. frigida Torr.	0,50-80
Leda	
caudata Don.	0,20-50
var. brevirostris Jeffr.	0,40-60
obtusa Sars	2—5
pella L.	0,20-40
rostrata Chm.	0,20-50
var. buccata Möller	0,30-60
tenuis Ph. = pygm. aut.	0,20-50
Crenella	
decussata Mtg.	0,10-20
faba Fabr.	0,20-50
Modiolaria	
corrugata Steenst.	0,30-80
costulata Risso	0,20-50
discors L.	0,30-80
laevigata Gray	0,20-30
marmorata Forb.	0,20-40
nigra Gray	0,30-1,20
Petagnae Scacchi	0,20-30
Dacrydium	
vitreum Möller	1,50
Modiola	
adriatica Lm.	0,20-30
var. ovalis Sow.	0,10-30

	Mk.
barbata L.	0,20-40
var. angustata Phil.	0,30-40
modiolus L.	0,30-1
phaseolina Phil.	0,10-30
plicatula Lm.	0,50-2
Mytilus	
edulis L.	0,10-30
v. galloprovincialis L.	0,20-50
var. incurvatus Penn.	0,30
var. pellucidus Pen.	0,20-40
minimus Poli	0,10-20
Lithodomus	
aristatus Dillw.	0,40-1
lithophagus L.	0,40-60
Avicula	
tarentina Lm.	0,80-1
Pinna	
nobilis L.	0,50-2,50
pectinata L.	1—2
Lima	
excavâta Chem.	3—5
hians Gm.	0,30-60
inflata Chm.	0,30-50
Sarsi Lovén	1-2,50
Loscambi Sow.	0,50-1
squamosa Lm.	0,30-50
subauriculata Mtg.	0,40-1
Pecten	
flexuosus Poli	0,30-80
glaber L.	0,20-1
hyalinus Poli	0,30-60
irradians Lm.	0,80-1,80
Jacobaeus L.	0,50-2
islandicus Müller	0,50-5
inflexus Poli	
maximus L.	0,50-1

	Mk.
opercularis L.	0,20-1
pusio L. (Hinnites)	0,30-2
Philippi Recl.	2,—
striatus Müller	0,40-80
Testae Biv.	0,30-40
tenuicostatus Mgh. u. Ads.	1—5
tigrinus Müller	0,30-60
varius L.	0,20-1
vitreus Chm.	0,30-60
Spondylus	
gaederopus L.	1—4
Gussonae Costa	2—4
Ostrea	
borealis Lm.	0,40-60
cristata Born.	0,50-1
edulis L.	0,20-1
plicata Chm.	0,30-80
Anomia	
ephippium L.	0,20-50
var. aculeata Müller	0,40-80
var. electrina Lam.	0,40-60
var. squamula L.	0,20-40
patelliformis L.	1—2
Terebratula	
minor Phil.	0,50-60
septemtrional. Couth.	0,50-1
vitrea Gm.	1—2
Terebratulina	
caput serpentis L.	0,50-1
Megerlea	
truncata L.	0,20-50
Rhynchonella	
psittacea Gm.	1—3
Crania	
anomala Müller	0,20-1

Sammlungen von Seeconchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiet werden zu nachstehenden Preisen geliefert:

100 Species . . . . Mark 25.—
200 „ . . . . „ 60.—
etc. etc.

Speziell für

Palaeontologische Vergleichsstudien

zusammengestellte Sammlungen geben wir ab in

100 Species . . . . Mark 60.—
200 „ . . . . „ 120.—

Ferner führen wir grosses Lager

fossiler Conchylien des Mainzer Beckens.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 57. 1885.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Conus

		Mk.
abbas L.	Ceylon	2—5
achatinus Ch.	Philippinen	1,50-5
acuminatus Hwss.	Oc. ind.	0,80-2,50
Amadis Ch.	„	1-2,50
ammiralis L.	„	3—15
anemone Lm.	Austral.	0,80-2
arenatus Hwss.	Philippinen	0,30-1
aulicus L.	Oc. ind.	3—6
aurantius Hwss.	Molukk.	2—20
augur Hwss.	Ceylon	0,60-3
aurisiacus L.	Molukken	8—30
australis Ch.	Australien	2—3
aureus Brug.	Molukken	5,—
arachnoideus Gm.	Oc. ind.	1-1,50
archiepiscopus Hwss.	Phil.	3,50
acutangulus Ch.	„	3,—
articulatus Sow.	Mauritius	2—3
auratus Hwss.	Ceylon	2—4
bandanus Hwss.	Philippn.	1—3
betulinus L.	Oc. ind.	1—2
bullatus L.	„	3—10
brunneus Wood	Panama	1—3
californicus Hinds	Californ.	0,60-1
canonicus Hwss.	Oc. ind.	0,10-2,50
capitaneus L.	Philippn.	0,20-1,20
catus Brug.	Tahiti	0,40-1
characteristicus Ch.	Ind. occ.	3—4
classiarius Hwss.	Montijo B.	1—3
consors Sow.	N. Caledon.	1—2
cedo nulli Klein v. dominicanus	W. Ind.	30,—
„ „ v. trinitarius	W. Ind.	20,—
coccineus Gml. (Solandri)	Philippn.	16—30
circumcisus Born = dux	Mollukken	12—45
carinatus Sow.	Philippn.	1—2
cinctus Sw.	„	3—4
clavus L.	„	1,50-5
Ceylonicus Ch. = obesus Hwss.	Ceylon	1—2
columba Lm.	Cuba	0,40-60
costatus Ch.	China	0,80-1,50
daucus Hwss.	Ind. occ.	1—2
distans, Hwss.	Austral.	1—3
eburneus Hwss.	Ceylon	0,30-1
Elisae Kien.	Madagascar	4—5
emaciatus Rve.	Viti-Ins.	1—2
encaustus Kien.	I. Marq.	2—3
episcopus Lm.	Ceylon	2—3
erythraeensis Beck	M. rubr.	0,60-80
figulinus L.	Amboin	0,40-1,50
floccatus Hwss.	Mollukk.	35,—
flavidus Lm.	Tahiti	0,30-80
fuscatus Born	Mauritius	1—2
Gabrieli Kien.	Philippn.	2—3
generalis L.	M. ind.	0,50-2
gladiator Brod.	Panama	0,50-1,20
geographus L.	Austral.	1—2
glans Hwss.	Philippn.	0,80-3
gubernator Hwss.	Mauritius	2—4
guinaicus Brug.	Sénégal	2—3
granulatus L.	W. Indien	6—10
glaucus L.	Philippn.	2—4
Hebraeus L.	Oc. ind.	0,30-1
hybridus Kien.	Sénégal	1—2
Janus Hwss.	Mauritius	4—6
imperialis L.	Philippn.	1—3
interruptus Brod.	Mazatlan	1,50-2,50
infrenatus Rve.	Cap.	2—4
intermedius Rve.	Oc. pacif.	4—5
incarnatus Rve.	Molukken	6—8
lineatus Ch.	Ceylon	0,50-1,20
lithoglyphus Meusch	Ticao	1,1-50
litteratus L.	Oc. ind.	1—2
lividus Hwss.	Philippn.	0,40-80
Leoninus Brug.	Antillen	2—3
Loroisii Kien.	Philippn.	3—4
lucidus Mawe	W. Columb.	2—5
magus L.	Oc. ind.	0,20-1
„ var. carinatus Hws.	Occ. ind.	0,50-2
Maldivus Hwss.	Ceylon	1—2
marmoreus L.	Oc. ind.	0,40-2
marchionatus Hinds	Philippinen	20—30
mercator L.	Sénégal	0,80-3
miles L.	Philippn.	0,40-2
miliaris Hwss.	Annaa	0,20-50
millepunctatus L.	Mauritius	1—2

		Mk.
minimus L.	Manil B.	0,20-50
monile Hwss.	Ceylon	0,50-1,50
Maltzanianus Weink.	W. Columb.	4,—
monachus L.	Molukken	1-1,50
mucronatus Rve.	N. Britt.	6—8
mediterraneus L.	M. med.	0,50-1
f. maxima	W. Afrika	2—4
mitratus Hwss.	Mauritius	5,—
mus Brug.	W. Indien	0,30-50
Nemocanus Hwss.	Oc. pacif.	0,50-2
nocturnus Hwss.	Molukken	3—10
Nov. Hollandia Ads.	N. Holl.	1-1,50
nussatella L.	Philippn.	0,50-2
nigropunctatus Sow. Oc. ind. = Adansoni Rve. non Lm.	M. rubr.	1—2
nebulosus Sol.	Ind. occ.	1—8
nimbosus Brug.	Ceylon	20—30
nobilis L. sehr schön!	Molukken	60,—
obesus Hwss.	Oc. ind.	1—2
omoria Hwss.	Ind. or.	0,50-1,50
Orbignyi Audouin	China	35—45
obscurus Humph.	Mauritius	1,50-2
papilionaceus Hwss.	Guinea	1—5
princeps L.	Amer. c.	3—4
„ var. regius	Mazatlan	3—10
pulicarius Hwss.	Tahiti	0.40-80
puncticulatus Hwss.	China	0,30-60
purpnrascens Brod.	Panama	1—3
Protheus Hwss.	W. Indien	2—4
Prometheus Brug.	W. Afrika	10,—
pertusus Brug.	Philippinen	4—6
panniculus Lm.	Mauritius	3,—
parvus Mart.	W. Indien	0,30-50
parius Rve.	Oc. ind.	1—2
pyriformis Rve.	Caracas	6—10
pyramidalis Lm.	Oc. ind	2—3
quercinus Hwss.	Ceylon	0,40-1,50
regalitatis Sow.	Real Lejl.	2—3
retifer Mke. = solidus	Oc. pacific.	5—8

		Mk.
rubiginosus Lm.	Mauritius	2,—
rosaceus Ch.	Natal	2—4
roseus Lm.	Antillen	3—4
regularis Sow.	Californien	2—4
rhododendron Couth.	Australien	12-100
senator L.	Oc. ind.	0,50-1,20
spectrum L.	Mauritius	1—3
sponsalis Ch.	L. Hood	0,30-40
stercus = muscarum L.	Ceylon	0,50-1,20
striatus L.	Austr.	0,40-1,20
sulcatus Hwss.	China	0,80-1,50
Sumatrensis Hwss.	Oc. ind.	2—3
spectrum L.	Ostindien	2—3
stillatus Rve.	Molukken	8—10
tabidus Rve.	Afric. occ.	2—5
taeniatus Hwss.	China	0,60-1
tahitensis, Hwss.	Tahiti	0,80-1,20
terebra Born	Philippn.	0,50-1,50
tesselatus Hwss.	Oc. ind.	0,40-1
testudinarius Mart.	Ind. occ.	1—3
textile L.	Oc. ind.	0,80-3
tulipa L.	Tahiti	1—2
thalasiarchus Gray	Philippn.	6—12
Timorensis Brug.	Timor	4—5
trigouus Rve.	Philippn.	12—20
Thomae Ch. = omaicus **(Prachtstück)**	Molukken.	300,—
varius L.	Philippn.	1—2
venulatus Hwss.	„	2—4
verriculum Rve.	Ceylon	1—2
vexillum Mart.	Philippn.	1—3
vicarius Lm.	Mauritius	1-1,50
virgo L.	Ceylon	0,30-1
viridulus Lm.	Oc. ind.	1—2
vitulinus Hwss.	„	0,50-1
vermiculatus Lm.	„	0,40-1
vittatus Lam.	Panama	3—10
virgatus Rve.	W. Amerika	3—5
Victoriae Rve.	Australien	3—6
zonatus Hwss.	Oc. ind.	20,—

Der Preis der Coniden hängt lediglich von dem Erhaltungszustande der Exemplare ab, daher die grosse Preisdifferenz.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren

Briefe einfach an die **„LINNÆA“, Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 59.
1885.

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

7 Elsheimerstrasse 7.

Land-Conchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiet.

Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

		Mk.
Testacella.		
bisulcata Risso	Gallia	0,40-60
haliotidea Drap.(testa)	„	0,40-50
animal in Alkohol	„	1-1,50
Maugei Fér.	Lusitan	0,40-50
Daudebardia.		
brevipes Drap.	Germ.	2,—
Langi Pfr. (animal)	Hungar.	2—3
rufa Drap.	Germ.	2,—
Saulcyi Bourg. (testa)	Kreta	1—2
„ „ (animal)	„	2—3
Glandina.		
Algira L.	Europ. merid.	0,20-40
Parmacella.		
Deshayesi Moq.Tand	Algeria	0,60
Limax.		
cinereus List. (testa interior)	Gallia	0,20-30
Vitrina.		
alpestris Cless.	Tirol	0,30-40
brevis Fér.	Germ.	0,20-30
Carniolica Bttg.	Carn.	0,30-40
diaphana Drap.	Germ.	0,20
f. Heynemanni Koch	„	0,20
elongata Drap.	„	0,20
major Fér.	„	0,10-30
nivalis Charp.	Helvetia	0,30-40
pellucida Müll.	Germ.	0,10-20
v. aff. annularis	Tirol	0,20
truncata Bttg.	Carn.	0,30-40
Hyalinia.		
aegopinoides v. Maltz.	Kreta	1—3
Alhambrae Kob.	Hispan.	0,30-40
alliaria Mill.	Anglia	0,20-40
Balmei Pot. et Mich.	Sardinia	0,30-50
Botterii Pfr.	Kreta	0,20-30
camelina Bourg.	Syria	0,30-40
cellaria Müll.	Germ.	0,10-20
v. Villae Mort.	Carn.	0,20-30
contracta Westl.	Germ.	0,20-30
crystallina Müll.	„	0,10
v. subterranea Bourg.	„	0,10-20
Cydoniensis Blanc.	Kreta	1-1,50
Cypria Pfr.	Cypern	1,—
deila Bourg.	Krim	0,40-50
Draparnaldi Beck.	Germ.	0,20-30
Erjaveci Brus.	Carn.	0,40-60
excavata Bean	Anglia	0,40 50
frondosula Mouss.	Graecia	0,20-40
fulva Drap.	Germ.	0,10
glabra Stud.	Transsylv.	0,20-30
hyalina Fér.	„	0,20-30
hydatina Rossm.	Kreta	0,20-30
Natolica Alb.	Brussa	0,50-1
nitens Mich.	Germ.	0,10-20
v. Helmi Gilb.	„	0,20
v. Szepi Hazay	Hungar.	0,20
nitida Müll.	Germ.	0,10
nitidula Drap.	„	0,10
petronella Charp.	„	0,10-20
protensa Fér.	Kreta	0,40-80
v. aequata Mouss.	Graecia	0,50-60
pura Alder	Germ.	0,10
radiatula Gray	Tirol	0,10
subrimata Reinhardt	„	0,10-20
superflua Rossm.	Kreta	1—2
Taurica Cless.	Krim	0,30-40
Zonites.		
acies Partsch	Dalm.	0,20-40
albanicus Ziegl.	„	0,30-50
Algirus L.	Gallia	0,30-50

		Mk.
chloroticus Pfr.	Magnia	0,80-1,50
compressus Ziegl.	Carn.	0,30-50
Croaticus Partsch	Croatia	0,20-40
pergrannulatus Godet.	Graec.	0,50-1
Smyrnensis Roth	Smyrna	0,40-80
verticillus Fér.	Croatia	0,10-30

Leucochroa.

		Mk.
argia Bourg.	Algier	0,50-60
Baetica Rossm.	Hispan.	0,50
Boissieri Charp.	Palaestina	0,30-40
candidissima Drap.	Algeria	0,10-20
cariosa Oliv.	Syria	0,20-30
v. crassicarina Mouss.	„	0,30-40
cariosula Mich.	Algeria	0,20
Debeauxiana Kob.	„	0,30-40
fimbriata Bourg.	Syria	1-1,20
Kobeltiana Deb.	Algeria	0,30-40
Mayrani Gass.	„	0,30-40
Otthiana Forb.	„	0,30-40

Patula.

		Mk.
Hierosolymitana Bgt.	Syria	0,20
pygmaea Drap.	Germ.	0,10
ruderata Stud.	Tirol	0,10
rupestris Drap.	Germ.	0,10
v. chorismenostoma Blanc	Graecia	0,20-30
rotundata Müll.	Germ.	0,10
semiplicata Pfr.	Madeira	0,30-50
solaria Mke.	Austria	0,10-20

Janulus.

		Mk.
stephanophora Desh.	Madeira	0,20-30

Helix.

		Mk.
abjecta Lowe	Madeira	0,30
aculeata Müller	Germ.	0,10
acuta Müller	Europ. mer.	0,10
advena Webb. et B.	Capv.	0,40
alabastrites Mich.	Algeria	0,20-30
Alonensis Fér.	Hisp.	0,20-30
alpina Faure-Big	Chartreuse	0,20-40
angigyra Zgl.	Italia	0,20
Apennina Porro	„	0,20-30
aperta Born	Kreta	0,20
apicina Lm.	Gallia	0,10
arbustorum L.	Germ.	0,10
arcta Lowe	Madeira	0,30
Argentellei Kob.	Graecia	1-1,50
Arigonis Rssm.	Hisp.	0,20-40
armillata Lowe	Madeira	0,20
Ascherae Kob.	Italia	0,30-40
aspersa Müll.	Gallia	0,10
f. sinistrossa	„	2,—
f. scalaris	„	2—4
atrolabiata Kryn.	Kauk.	0,80-1,20
attrita Lowe	Madeira	0,30
Balearica Zgl.	Balear.	0,30-50
barbata Fér.	Kreta	0,40-50
barbula Charp.	Lusitan.	0,30-40
bathyomphala Charp.	Italia	0,20
bathytera Westl.	Kreta	0,30-40
bidens Ch.	Germ.	0,10
v. dibothrion Friv.	Trans.	0,40-50
Boettgeri Kob.	Marocco	1—2
Boissyi Terv.	Balearen	0,30-40
Bowdichiana Fér. subf.	Mad.	0,50-60
Bulwerii Wood.	„	0,30-40
caerulans Mühlf.	Dalm.	0,20
Caesareana Parr. (spiriplana aut.)	Syria	0,60-1
calva Lowe	Madeira	0,30
candicans Zgl.	Germ.	0,10
candidula Stud.	„	0,10
Cantiana Mft.	„	0,20
caperata Mtg.	Anglia	0,10-20
Caroni Dsh.	Sicil.	0,20-30
Castanea Oliv. (radiosa Zgl.)	Brussa	0,50-1
Carthusiana Müll.	Gallia	0,10-20
cespitum Drap.	„	0,20-30
cheiranthicula Lowe	Mad.	0,30-40
cincta Müll.	Italia	0,20-30
v. Pollini Camp.	„	0,30-40
cinctella Drap.	„	0,10-20
cingulata Stud.	„	0,10-30
v. Anauniensis Betta	„	0,20-30
v. carrarensis	„	0,20-30
v. colubrina Jan.	„	0,20-30
cingulella Zgl.	Hungaria	0,20-30
cobresiana Alt.	Tirol	0,10
codia Bourg.	Lusitan.	1-1,50
coelata Stud.	Germ.	0,20
Colomiesiana Bourg.	Algeria	0,20-30
compacta Lowe	Madeira	0,30
Companyoni Aler	Balear.	0,30-40
conoidea Drap.	Gallia	0,10-20
consors Lowe	Madeira	0,30
conspurcata Drap.	Lusitan.	0,10-20
Constantinae Forb.	Algeria	0,30-40
Coquandi Morl.	Hisp.	0,30-50
cornea Drap.	Gallia	0,20-30

		Mk.			Mk.
corrugata Gm.	Sicil.	0,20-40	Hellenica Bourg.	Graeca.	0,20
costata Müller	Germ.	0,10	hieroglyphiculaMüll.	Algeria	0,20-30
v. pulchella Müller	„	0,10	hispida L.	Germ.	0,10
costulata Zgl.	„	0,10	v. concinna Jeffr.	Anglia	0,10-20
Cretica Fèr.	Kreta	0,10-30	Hoffmanni Partsch.	Dalm.	0,50-1
v. alba	„	0,20	holosericea Stud.	Helvetia	0,10-20
v. cauta Wl.	Graecia	0,10-20	homoleuca Stab.	Dalm.	0,20
crinita Sandri	Dalm.	1—2	hortensis Müll.	Germ.	0,10
cyclolabris Desh.	Graecia	0,20-40	Heynemanni Kob.	Marocco	0,30-40
v. Heldreichi Sh.	„	0,20-30	ichtyomma Held	Bavaria	0,20-30
v. sphaeriostoma Bourg.	„	0,30-50	v. achates Zgl.	Tirol	0,20
Dautezi Kob.	Algeria	0,20-40	improbata Mouss.	Syria	0,30-40
dealbata Lowe	Madeira	0,30	incarnata Müller	Germ.	0,10
degenerans Mss.	Marocco	1-1,20	intermedia Fér.	Carn.	0,20
Dehnei Rm.	„	0,30-40	Jolii Bourg.	Algeria	0,30-50
delphinula Lowe subf.	Mad.	0,30-60	Jourdaniana Bourg.	„	0,40-60
depauperata Lowe	„	0,20-30	Juilleti Terv.	„	0,30-40
depressula Parr.	Algeria	0,20-40	lactea Müller	Hisp.	0,10-20
derogata Rm.	Hispan.	0,20-30	v. alybensis Kob.	„	0,30-40
desertella Jick.	Abess.	0,50-80	Lacosteana Mor.	Algeria	0,80-1,20
desertorum Forsk.	Aegypt.	0,20-30	lamellata Jeffr.	Germ.	0,20-30
v. inflata	„	0,30	Langloisiana Bourg.	Syria	0,30
destituta Charp.	Italia	0,20	lanuginosa Boissy.	Balear.	0,30-40
Diensis v. Maltz.	Kreta	0,40-50	v. roseotincta Forb.	Algeria	0,20-30
Dupotetiana Terv.	Algeria	0,30-40	lapicida L.	Germ.	0,10
elata Faur. Big.	Sicil.	0,20-30	Ledereri Pfr.	Syria	0,20-40
elegans Gm.	Eur. mer.	0,10	Lefeburiana Fér.	Carn.	0,20-30
v. alba	Hispan.	0,10	lens Fér.	Graecia	0,10-20
ericetorum Müller	Germ.	0,10	v. lentiformis Zgl.	„	0,10-20
Eugenia Pfr. v. Huetiana			lenticula Fér.	Hisp.	0,10
	Sicil.	0,30-50	lenticularis Morl.	Maracco	0,50-80
euphorca Bourg.	Algeria	0,20-30	lentiginosa Lowe	Madeira	0,20-30
euxina Cless.	Krim	0,20-30	leptosticta Lowe	capverd	0,40-50
explanata Müller	Hispan.	0,20-30	limbata Drap.	Gallia	0,20-30
faustina Zgl.	Transsylv.	0,20-30	Loxana Rm.	Hisp.	0,30-50
figulina Parr.	Graecia	0,30-40	Lucasii Desh.	Algeria	0,30-40
filimargo Kryn.	Krim	0,20-30	lucorum Müll.	Italia	0,30-50
frequens Mouss.	Brussa	0,30-40	luteata Parr.	Lusitan.	0,30-40
Freytagi v. Maltz.	Kreta	0,80-1	lutescens Ziegl.	Transsylv.	0,30-40
frigida Jan.	Italia	0,20-30	macrostoma Mühlf.	Sicil.	0,30-40
fruticola Kryn.	Krim	0,30-40	Maderensis Wood.	Madeira	0,20-30
fruticum Müller	Germ.	0,10	Majoricensis Dhrn.	Balearen	0,30-40
fusca Mtg.	Anglia	0,30-40	maritima Drap.	Lusitan.	0,10-20
Galloprovincialis Dup.			marmorata Fér.	Hisp.	0,30-40
(cantiana pars)	Gallia	0,10-20	Maroccana Morl.	Marocco	1—2
glacialis Thomas	Mt. Cenis	0,30-40	Martensiana Tib.	Italia	0,20-30
Glasiana Sh.	Teneriffa	0,40-50	Massylaea Morl.	Algeria	1,50-2
globularis Zgl.	Sicil.	0,20-30	mauritanica Bourg.	„	0,20-30
Gobanzi Frauenf.	Carn.	0,20-30	Mazzullii Jan.	Sicil.	0,20-40
Grateloupi Grälls	Baleria	1—2	melanostoma Drap.	Gallia	0,20-30
Gualteriana L.	Hispan.	0,80-1,50	mesostena Westl.	Kreta	0,30-40

		Mk.
Michaudi Desh.	Madeira	0,20
Milaschewitzschi Ret.	Krim	0,20-30
Minoricensis Mittre	Balear.	0,30-40
muralis Müll.	Italia	0,10-20
v. undulata	Sicil.	0,20-30
Naxiana Fér.	Kreta	1-2,50
v. Westerlundi Blanc	„	1—2
Nebrodensis Mandr.	Italia	0,20-40
neglecta Drap.	Gallia	0,20-30
nemoralis L.	Germ.	0,10
v. albolabiata L.	„	0,20
Newka Dbrn.	Balearen	0,30-40
Niciensis Fér.	Gallia	0,20-30
nitidiuscula Sow.	Madeira	0,30-40
Nordmanni Parr.	Kauk.	1,—
noverca Westl.	Kreta	0,40-80
nummus Ehrbg.	Syria	0,20-30
Nyeli Mittre	Balearen	0,20-30
Oberndorfi Kob.	„	0,30-40
obserata Lowe	Madeira	0,20-30
obstructa Fér.	Syria	0,20-30
obtecta Lowe	Madeira	0,30
obtusata Zgl.	Krim	0,30-40
obvoluta Müll.	Germ.	0,10
Olivieri Fér.	Graecia	0,20
v. parumcincta Parr.	„	0,10-20
Oranensis Morl.	Algeria	0,20-30
orduñiensis Kob.	Hisp.	0,20-30
oxytropis Lowe	Madeira	0,30-40
Paciniana Phil.	Sicil.	0,20-30
Parrnasia Roth	Graecia	0,40-60
= Codringtoni var.		
paupercula Lowe	Madeira	0,20
pellita Fér.	Graecia	0,20-30
f. major	Kreta	0,40-50
personata Lmk.	Germ.	0,10
phalerata Zgl.	Carn.	0,10-30
phleobophora Lowe	Madeira	0,40-50
„ subfossil	„	0,20
piratarum Kob.	Algeria	0,30-50
pisana Müller	Gallia	0,10
f. sinistrorsa	„	1—2
f. scalaris	„	2—3
platychela Mke.	Sicil.	0,20-40
polymorpha Lowe	Madeira	0,20-30
v. pulvinata Lowe	„	0,20-30
pomatia L.	Germ.	0,10-20
v. compacta Haz.	Hungar.	0,20-30
v. Hajnaldyana Haz.	„	0,30-40
v. pannonica „	„	0,20-30
v. Pulskyana Haz.	Hungar.	0,20-30
v. sabulosa „	„	0,10-20
v. solitaria „	„	0,20
pomacella Parr.	Brussa	1-1,50
Ponsi Hid.	Balearen	0-30,40
Portosanctana Sow.	Madeira	0,30-50
Pouzolzi Payr.	Dalm.	0,40-60
Preslii F. Schm.	Carn.	0,20-30
Prietori Hid.	Balearen	0,30-40
Pringi Pfr.	Lusitan	0,20-30
profuga A. Schm.	Kreta	0,10-20
v. major	„	0,30
Psiloritana v. Maltz.	„	0,40-50
punctata Müll.	Hisp.	0,20-30
punctulata Sow.	Madeira	0,30-40
„ subfossil	„	0,20
pyramidata Drap.	Italia	0,10
Pyrenaica Drap.	Gallia	0,30-40
Quimperiana Fér.	„	0,40-60
Raspaili Pfr.	Corsica	0,50-80
Rothi Pfr.	Kreta	0,20-40
rotula Lowe	Madeira	0,40
Rozeti Mich.	Algeria	0,30
rubiginosa Schm.	Germ.	0,10
rufescens Penn.	Anglia	0,10-20
v. clandestina Born	Helvetia	0,10-20
v. danubialis Cless.	Germ.	0,10-20
v. montana Stud.	„	0,10-20
scabriuscula Desh.	Sicil.	0,20-40
Scherzeri Zeleb.	Hisp.	0,40-50
Schmidti Ziegl.	Krain	0,20-30
sicanoides Kob.	Marokko	1,50-2
Siderensis v. Maltz.	Kreta	0,40-50
secernenda Rm.	Dalm.	0,30-40
Seetzeni Koch	Syria	0,20-30
sericea Drap.	Germ.	0,10-20
serpentina Fér.	Italia	0,20
serta Alb.	Capverd.	0,30-40
setipila Zgl.	Dalm.	0,30-40
setosa Zgl.	„	0,30-40
sicana Fér.	Sicil.	0,20-30
soluta Mich.	Algeria	0,20-30
sphaerita Hartm.	„	0,20-30
Sphakiota v. Maltz.	Kreta	0,40-60
spirorbis Lowe	Madeira	0,20
splendida Drap.	Gallia	0,10-20
strigata Müller	Italia	0,20-30
strigella Drap.	Germ.	0,10
sublecta v. Maltz. (lecta aut.)	Kreta	0,50-60

		Mk.
f. minor	Kreta	0,30-40
subvariegata v. Maltz	„	0,30-50
suspecta Westl.	„	0,30-40
submeridionalis Bourg.	Algeria	0,20-30
subplicata Sow.	Madeira	1—2
„ subfossil	„	0,80
Sultana Morl.	Marokko	1,50-2,50
Surrentina A. Schm.	Italia	0,20
sylvatica Drap.	Helvetia	0,20
v. rhenana Kob.	Germ.	0,20
Syriaca Ehrbg.	Kreta	0,20-30
tectiformis Sow.	Madeira	0,30-40
testudinalis Lowe	„	0,50
thiarella Webb. (subf)	„	0,20
Thiesseana Mouss.	Graecia	0,20
tigrina Jan.	Italia	0,20-30
triaria Friv.	Transsylv.	0,20-30
trizona Zgl.	Hungar.	0,50-60
trochoides Poir.	Italia	0,10-20
tuberculosa Conr.	Syria	0,30-40
turbinata Jan. (Candiota)	Kreta	0,20-30
turricula Lowe	Madeira	0,50-60
turriplana Morl.	Lusitan.	0,30-40
umbilicaris Brum.	Carn.	0,20-30
v. albina Gredl.	Tirol	0,30-40
umbrosa Partsch	Germ.	0,10
undata Lowe	Madeira	0,40-50
„ subfossil	„	0,30
variabilis Drap.	Europ. mer.	0,10-20
v. virgata Mtg.	„	0,10-20
variegata Friv.	Graecia	0,10-20
ventricosa Drap.	Europ. mer.	0,10-20
vermiculata Müll.	„	0,10-20
v. minor	Kreta	0,20
v. pachychila	„	0,30-50
vicina Rm.	Transsylv.	0,30-40
Vindobonensis Pfr.	Hungar.	0,10-20
Zafferina Fér.	Algeria	0,20-40
v. Zelleri Kob.	„	0,20-40
Zelebori Pfr.	Serbia	0.20-40

Buliminus.

		Mk.
albiplicatus v. Mart.	Turkst.	0,60-80
Bergeri Roth	Graecia	0,20-30
bidens Kryn.	Krim.	0,20-40
v. costatus Retow.	„	0,20-30
carneolus Mouss.	Constant.	0,50-60
chondriformis Mouss.	Syria	0,30
Cretensis Pfr.	Kreta	0,50-80
v. elongata	„	0,80
detritus Müll.	Germ.	0,10
v. radiatus	„	0,10
v. inflatus Parr.	Brussa	0,30
dirphicus Blanc.	Graecia	0,30-40
eburneus Pfr.	Asiaminor	0,30-40
eremita Bens.	Turkest.	0,80-1
etuberculatus Frfld.	Graecia	0,50-60
Forbesi Morl. et Desh.	Azor.	0,30
Frivaldskyi Pfr.	Brussa	0,60-80
gibber Ziegl.	Krim	0,30
Graecus Beck	Graecia	0,40-50
Hohenackeri Kryn.	Caucas.	0,40-50
intumescens v. Mart.	Turkest.	0,40-50
labrosus Oliv.	Syria	1,—
v. diminutus Mouss.	„	0,60
lamelliferus Rossm.	Dardan.	0,20-30
Merduenianus Kryn.	Krim.	0,30-50
microtragus Rossm.	Thessal.	0,20-40
montanus Drap.	Germ.	0,10
niso Risso	Dardan.	0,20-30
obscurus Müll.	Germ.	0,10
obtusus Drap.	Austria	0,40-50
olivaceus Pfr.	Kreta	0,30-40
Olympicus Parr.	Brussa	0,40-50
orientalis Friv.	Constant.	1,20-1,50
Ossicus Bttg.	Thessalia	0,60-80
ovularis Oliv.	Syria	0,20-30
v. sulcidens Mouss.	„	0,20-30
pupa Brug.	Graecia	0.20
pusio Brod.	„	0,30-40
quinquedentatus v. Mühlf.	Dalm.	0,20-30
Raynevalianus Bourg.	Dard.	1-1,50
reversalis Bielz.	Transsylv.	
v. alpestris Bielz.	„	0,30-40
v. brevis Bielz.	„	0,30-40
v. venerabilis Parr.	„	0,30-40
Rossmaessleri Pfr.	Brussa	0,60-80
Saulcyi Bourg.	Syria	0,30-40
scapus Friv.	Syria	0,40-60
septemdentatus Roth.	„	0,20-30
sidoniensis Charp.	„	0,50-80
sogdianus v. Mart.	Turkest.	0,60-80
squalinus Rossm.	Brussa	0,20-30
Sturmi Küst.	„	0,80-1
subulatus Rossm.	Krim	0,30-40
tauricus Lang.	„	0,20-40
v. Retowskianus Cless.	„	0,20-30

		Mk.
v. zebriola Cless.	Krim	0,20-30
Thiesseanus Mouss.	Graecia	0,20-30
todillus Morl.	Algeria	0,30-40
Tournefortianus Fér.	Brussa	0,30
tridens Müll.	Germ.	0,10-20
v. eximius Rossm.	Trans.	0,20
zebra Oliv.	Graecia	0,10
v. boeticus Bourg.	„	0,20

Cionella.

		Mk.
acicula Müll.	Germ.	0,10
v. Liesvillei Bourg.	Syria	0,20
agraecia Bourg.	Algeria	0,30
amblya Bourg.	„	0,20-30
folliculus Gronov.	Hispan.	0,10-20
f. Vescoi Bourg.	„	0,10-20
gracilenta Morl.	Algeria	0,20-30
gracilis Lowe.	Madeira	0,20-30
Hierosolymarum Roth	Syria	0,20-30
Jani de Betta(veneta Charp.)	Tirol	0,30-40
Hohenwarti Rossm.	Italia	0,30-50
Letourneuxi Bourg.	Algeria	0,30-40
lubrica Müll.	Germ.	0,10
v. nitens Kok	„	0,20
mabilliana Fagot.	Gallia	0,20-30
Maderensis Lowe.	Madeira	0,20
Maltzani Cless.	Kreta.	0,30-40
melampoides Lowe.	Madeira	0,30-40
mitraeformis Lowe.	„	0,20-30
Moussoniana Bourg.	Syria	0,20-30
nanodea Bourg.	Algeria	0,20-30
oryza Lowe.	Madeira	0,20
ovuliformis Lowe	„	0,20-30
procerula Morl.	Algeria	0,30-40
pupaeformis Cantr.	Dalm.	0,20-30
tornatellina Lowe.	Madeira	0,20
tridens Pult	Germ.	0,20-30
v. Nouletiana Dup.	Gallia	0,30
triticea Lowe.	Madeira	0,20-30
tumulorum Bourg.	Graecia	0,20-30
vitrea Webb.	Madeira	0,10-20

Stenogyra.

		Mk.
decollata L.	Europ. mer.	0,10-20
v. cylindrica	Kreta	0,20

Pupa.

		Mk.
affinis Rossm.	Gallia	0,30-40
Algesirae Kob.	Hispan.	0,30-40
alpestris Alder	Danemark	0,20
angustior Jeffr.	Germ.	0,10
antivertigo Drap.	„	0,10
arctica v. Wll.	„	0,20
avenacea Brug.	Brussa	0,10
Bergamensis Charp.	Italia	0,10-20
biplicata Mich.	Gallia	0,20-30
v. excessiva Gredl.	Tirol	0,30
Brauni Charp.	Hispan.	0,20-30
Brondeli Bourg.	Algeria	0,20-30
calathiscus Lowe.	Madeira	0,20
calpica Westl.	Hispan.	0,30
cassida Lowe	Madeira	0,30-40
cheilogena Lowe.	„	0,20-30
claustralis Gredl.	Tirol	0,20-30
concinna Lowe	Madeira	0,20-30
conica Rossm.	Carn.	0,20-30
costulata Nilss.	Germ.	0,10-20
cylindraceà D. C.	Brussa	0,10
doliolum Brug.	Germ.	0,10
v. scyphus Friv.	Constant.	0,10-20
dolium Mich.	Germ.	0,10-20
edentula Drap.	„	0,10-20
v. Gredleri v. Mart.	„	0,20
Farinessii Desm.	Gallia	0,20
Ferrari Porro.	Italia	0,10-20
ferraria Lowe.	Madeira	0,20
frumentum Drap.	Germ.	0,10
v. apennina Charp.	Italia	0,10-20
v. cylindracea	Dalm.	0,10-20
v. curta Küst.	Tirol	0,10-20
v. elongata Rossm.	„	0,10-20
v. Illyrica Rossm.	„	0,10-20
fusca Lowe.	Madeira	0,20
Genesi Gredl.	Tirol	3,—
granum Drap.	Kreta	0,10
gularis Rossm.	Carinth.	0,20
v. spoliata Rossm.	Tirol	0,20
irrigua Lowe.	Madeira	0,20-30
jumillensis Guir.	Hispan.	0,30-40
Kobelti Hid.	„	0,30
Kokeili Rossm.	Carn.	0,20-30
Lilljeborgi Westl.	Suetia	0,20-30
Lusitanica Rossm.	Lusitan.	0,30-40
manotiana Bourg.	Hispan.	0,30-40
megachilos Jan.	Italia	0,10-20
v. bigorriensis	Gallia	0,20
Michaudi Terv.	Algeria	0,30
millegrana Lowe.	Madeira	0,20
minutissima Hartm.	Germ.	0,10-20
monticola Lowe.	Madeira	0,20

		Mk.
Moulinsiana Dup.	Germ.	0,20
Mühlfeldtii Küst.	Dalm.	0,10
muscorum L.	Germ.	0,10
oblitterata Charp.	Hispan.	0,20-30
occulta Parr.	Sicil.	0,20-30
opisthodon Reinh.	Hungar.	0,20
pagodula Desm.	Germ.	0,10
v. gracilis Bttg.	Croatia	0,20
pallida Pfr.	Italia	0,20
v. amycta Parr.	„	0,10-20
Philippii Cantr.	Graecia	0,10
polyodon Mich.	Gallia	0,20
pusilla Müll.	Germ.	0,10-20
pygmaea Drap.	„	0,10
Pyrenaearia Mich.	Hispan.	0,30
v. saxicola Moq. Tand.	„	0,30
recta Lowe.	Madeira	0,20-30
Rhodia Roth.	Graecia	0,10-20
ringens Mich.	Hispan.	0,20
Rossmaessleri Schm.	„	0,30-40
saxicola Lowe. (semiunulum Lowe.)	Madeira	0,20
secale Drap.	Germ.	0,10
v. Boileausiana Charp.	Gallia	0,20-30
Semproni Charp.	„	0,10-20
v. dilucida Ziegl.	Tirol	0,10-20
sphinctostoma Lowe.	Mad.	0,20-30
striata Gredl.	Tirol	0,20-30
Strobeli Gredl.	„	0,20
substriata Jeffr.	Germ.	0,20
superstructa Mouss.	Caucas.	0,20
Tingitana Kob.	Marocco	0,30
triplicata Stud.	Helvet.	0,10-20
truncatella Ziegl.	Transylv.	0,20-30
variabilis Drap.	Gallia	0,10-20

Balea.

		Mk.
perversa L.	Germ.	0,10

Clausilia.

		Mk.
Adelinae Ben.	Sicil.	0,20-30
Agesilaos v. Mart.	Graecia	0,30
agnata Partsch	Croatia	0,10
v. albescens Mke.	„	0,20
albocincta Pfr.	Dalm.	0,20
almissana Küst.	„	0,20-40
v. minor	„	0,20-30
Alschingeri Küst.	„	0,20-30
altecostata Pfr.	Graecia	0,40-50
amalthea Westl.	Kreta	0,30-40
v. similis Bttg.	„	0,30
anaphiensis Bttg.	Graecia	0,50
angustata Bielz	Transsylv.	0,30
approximans Ziegl.	Carn.	0,50-60
aquila Parr.	Dalm.	0,30
Arcadica Bttg.	Arcad.	0,50-60
archilabris Küst.	Dalm.	0,20-40
armata Kutsch.	„	0,20-40
Arthuriana Blanc.	Kreta	0,80-1
asphaltina Ziegl.	Carn.	0,20
baeotica Küst.	Graecia	0,40-50
Bergeri Mayer	Germ.	0,10-20
bicristata Friv.	Graecia	0,20
v. major	„	0,30
v. canaliculata Pfr.	„	0,20
v. tetragonostoma Pfr.	„	0,20-30
bidens L.	Italia	0,10
bidentata Ström.	Germ.	0,10
v. meridionalis Fagot	Gallia	0,20
v. septentrionalis Sch.	Norw.	0,20
Bielzi Parr.	Transsylv.	0,20
v. clathrata Friv.	„	0,30
v. Madensis Fuss	„	0,20-30
bilabiata Wagn.	Dalm.	0,20-30
binodata Ziegl.	„	0,20
v. consentanea Zigl.	„	0,30
bipalatalis v. Mart.	Kreta	0,30
v. gracilior Bttg.	„	0,20-30
biplicata Mtg.	Germ.	0,10
subsp. bohemica Cless.	„	0,20-30
Blanci v. Mart.	Graecia	0,20
blanda Ziegl.	Dalm.	0,40-50
Bogatensis Bielz	Transsylv.	0,30
Boissieri Charp.	Syria	0,20-30
Brusinae Kutsch.	Dalm.	0,50
byzantina Charp.	Kreta	0,30-40
v. intermedia A. Schm.	„	0,30
v. solidula Pfr.	„	0,20
f. minor	„	0,20
caerulea Fér.	Syria	0,10-20
v. amorgia Bttg.	Graecia	0,10-20
v. Antiparia Bttg.	„	0,10-20
v. birugosa Parr.	„	0,10-20
v. Naxia Bttg.	„	0,10-20
v. Nia Bttg.	„	0,10-20
v. Tinorensis Mouss.	„	0,10-20
Calcarae Phil.	Sicil.	1,—
callifera Küst.	Dalm.	0,20-30
cana Held	Germ.	0,10-20
v. iostoma A. Schm.	Transsylv.	0,30
v. Transsylvanica Bielz	„	0,20-30

		Mk.
Candida Pfr.	Kreta	0,40
candidescens Ziegl.	Italia	0,10
v. cinerea Phil.	„	0,10-20
canescens Parr.	Transsylv.	0,10-20
Carinthiaca A.Schm.	Carinth.	0,30
Carniolica Ziegl.	Carn.	0,30
Cattaroensis Ziegl.	Dalm.	0,10-20
Chia Bttg.	Graecia	0,20-30
v. Samia Bttg.	„	0,20-30
v. submarginata Bttg.	„	0,20-30
cincta Rossm.	Carn.	0,10-20
v. Rossmaessleri Pfr.	„	0,10-20
circumdata Friv.	Brussa	0,30-40
clandestina Rossm.	Graecia	0,30
v. Thiesseae Bttg.	„	0,30-40
clara Bttg.	Kreta	1—2
v. paucicostata Bttg.	„	1-1,50
coarctata Mouss.	Graecia	0,20-30
comensis Schuttl.	Tirol	0,20-30
commutata Rossm.	Carn.	0,10-20
v. fusca de Belta	Italia	0,10-20
v. ungulata Ziegl.	Carn.	0,10-20
compressa Pfr.	Graecia	0,20-30
concilians A. Schm.	Transsyl.	0,20
Conemenosi Bttg.	Graecia	0,30-40
confusa Bttg.	„	0,40
conspurcata Jan.	Dalm.	0,10
v. subcrenata Parr.	„	0,30
corpulenta Friv.	Brussa	0,20
corrugata Drap.	Kreta	0,40-50
v. almyrosana Bttg.	„	0,30
v. homaloraphe Bttg.	„	0,40
subsp. inflata Oliv.	„	0,20
„ v. gracilior Bttg.	„	0,30
„ Draparnaldi Beck	„	0,50
corynodes Held	Germ.	0,10-20
costulata Jan	Italia	0,20-30
crassilabris Küst.	Dalm.	0,30
v. callida Parr.	„	0,30
Cretensis Rossm.	Kreta	0,80-1
cruciata Stud.	Helvet.	0,10
v. minima A. Schm.	Germ.	0,20
Dacica Friv.	Bosnia	0,30
Dalmatina Partsch	Dalm.	0,20
v. minor Parr.	„	0,20
decipiens Rossm.	„	0,20-30
deltostoma Lowe	Madeira	0,20
v. obesiuscula Lowe	„	0,40
v. undulata	„	0,20
densestriata Ziegl.	Carn.	0,10-20
denticulata Oliv.	Graecia	0,40-50
detersa Ziegl.	Krim	0,30
discolor Pfr.	Graecia	0,30
v. inaequata Blanc	„	0,20-30
dissipata Bttg.	„	0,30-40
divergens Klec.	Dalm.	0,30-40
Drakakisi v. Maltz.	Kreta	0,80-1
(= extensa Bttg. non Pfr.)		
v. centralis Bttg.	Kreta	0,60-80
dubia Drap.	Germ.	0,10
v. gracilis Pfr.	Hungar.	0,20
v. Grimmeri Parr.	Germ.	0,20
v. major	Helvet.	0,20
v. speciosa A. Schm.	Hungar.	0,20-30
v. Transsylvanica A. Schm.	Transsylv.	0,20
v. Vindobonensis A. Schm.	Hungar.	0,20
Duboisi Charp.	Caucas.	0,20
elata Ziegl.	Transsylv.	0,20
elegans Bielz	„	0,20
exarata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
exigua Lowe.	Madeira	0,40-50
extensa Pfr. (Vesti Böttg.)	Kreta	0,50-60
v. orientalis Bttg.	„	0,40-50
v. maxima „	„	1,—
fallax Rossm.	Transsylv.	0,20
filograna Ziegl.	Germ.	0,10-20
fimbriata Mühlf.	Illyr.	0,10-20
v. pallida Jan.	„	0,10-20
formosa Ziegl.	Dalm.	0.20-30
foveicollis Parr.	Caucas.	0,20-30
fulcrata Ziegl.	Dalm.	0,60
Fussiana Bielz	Transsylv.	0,20
v. pruinosa Bielz	„	0,40
gastrolepta Ziegl.	Dalm.	0,20
v. Freyeri Küst.	„	0,20
gibbula Ziegl.	„	0.10
v. peucetana Kob.	„	0,20
glabella Pfr.	Kreta	0,60-80
glauca Bielz	Transsylv.	0,20
v. minor Bielz	„	0,20
glorifica Rossm.	„	0,30
Goldfussi Bttg.	Graecia	0,60-80
Goldi Kutsch.	Dalm.	0,30-40
Grabusana Bttg.	Kreta	1,—
v. humillima Bttg.	„	0,60-80
gracilicosta Ziegl.	Krim	0,30
graciliformis Kutsch.	Dalm.	0,30

		Mk.			Mk.
Grayana Pfr.	Dalm.	0,30	Macarana Ziegl.	Dalm.	0,20-30
grisea Desh.	Graecia	0,10-20	v. stenostoma Rossm.	„	0,30
Grohmanniana Partsch	Pal.	0,20-30	maculosa Desh.	Graecia	0,20-30
grossa Ziegl.	Carn.	0,20-30	Maderensis Parr.	Madeira	0,30-40
gulo Rossm.	Transsylv.	0,30-40	maesta Fér.	Syria	0,20-30
Haueri Bielz	„	0,30-40	magniventris Küst.	Dalm.	0,20-30
Helenae Klec.	Dalm.	0.40-50	Maltzani Bttg.	Kreta	1—2
hetaera Friv.	Bospor.	0,40-50	marginata Ziegl.	Transsylv.	0,20
hians Bttg.	Alban.	0,30-40	Marisi A. Schm.	„	0,30
Hippoliti Blanc	Kreta	1,—	maritima Klec.	Dalm.	0,30-40
Huebneri Rossm.	Natolia	0,40-60	v. Thiesseana Bttg.	Graecia	0,30-40
humilis Küst.	Transsylv.	0,40-50	MeschendoerferiBielz.	Trans.	0,40-50
incisa Küst.	Italia	0,20	Messenica v. Mart.	Graecia	0,20
incommoda Bttg.	Zante	0,20-30	modesta Ziegl. v. interpicta		
interrupta Ziegl.	Carn.	0,10-20		Cephalon.	0,20-30
f. albina Carn.	„	0,10-20	montana Stentz	Transsylv.	0,20-30
Josephinae Bttg.	Graecia	0,30-50	v. viridana Ziegl.	„	0,30
isabellina Pfr.	„	0,20	Montenegrina Küst.	Dalm.	0,30-40
Itala v. Marts.	Italia	0,10-20	Moreletiana Blanc	Kreta	0,60
v. Braunii Charp.	Germ.	0,20	v. minor	„	0,50
v. ornata Bttg.	Italia	0,10-20	mucida Ziegl.	Carn.	0,10-20
v. punctulata Mich.	„	0,20	v. badia Rossm.	„	0,10-20
v. rubiginea Ziegl.	„	0,20	v. fontana F. Schm.	„	0,30
Kephissiae Roth.	Graecia	0,20	munda Ziegl.	Smyrna	0,30-40
Krueperi Zel. v. furcilla			muralis Küst.	Dalm.	0,50-60
Westl.	Graecia	0,30-40	naevosa Fér. v. corcyeensis		
v. holostoma Bttg.	„	0,30-40	Mouss.	Graecia	0,20-30
Kutschigi Küst.	Dalm.	0,30-40	v. epirotica Mouss.	„	0,20-30
v. contracta Ziegl.	„	0,30	v. senilis Rossm	„	0,20-30
laevissima Ziegl.	„	0,10-20	negropontina Pfr.	„	0,20-30
v. pachygastris Partsch	„	0,20	v. costulata Thiesse	„	0,20-30
v. superstructa „	„	0,20	nobilis Pfr.	Sicil.	1—2
lamellata Ziegl.	„	0,40	notabilis Küst.	Dalm.	0,50-60
lamellosa Wagn.	„	0,20	ornata Ziegl.	Tirol	0,10-20
laminata Mtg.	Germ.	0,10	v. gracilis Bttg.	„	0,20
v. alpestris Bielz	Transsylv.	0,20-30	orthostoma Mke.	Germ.	0,10
v. dubiosa Cless.	Carn.	0,10-20	v. filiformis A. Schm.	Trans.	0,10-20
latestriata Bielz	Transsylv.	0,20	Oscari Thiesse	Graecia	0,60-80
Letochana Gredl.	Tirol	0,30	osculans v. Mart.	„	0,20-30
v. Funki Küst.	„	0,30	pachychila Ziegl.	Dalm.	0,20
leucoraphe Blanc	Graecia	0,30-40	pachystoma Küst	„	0,20
leucostigma Ziegl.	Italia	0,10	v. minor	„	0,20
v. candidilabris Porro	„	0,10	Pagana Ziegl.	Transsylv.	0,20-30
v. opalina Ziegl.	„	0,20	Parreyssi Ziegl.	„	0,30
lineolata Held.	Germ.	0,10	parvula Stud.	Germ.	0,10
v. modulata Parr.	Italia	0,20	Pauli Mab.	Gallia	0,30-40
Lischkeana Parr.	Transsylv.	0,10-20	Pfeifferi Küst.	Dalm.	0,20
v. cornea A. Schm.	Germ.	0,10-20	piceata Ziegl.	Italia	0,20
Lowei Alb.	Madeira	0,80	v. gracilior Charp.	„	0,20
lunellaris Pfr.	Graecia	0,20	Pikermiana Roth	Graecia	0,20

		Mk.
plicata Drap.	Germ.	0,10
forma implicata	„	0,20
plicatula Drap.	„	0,10
v. nana Schm.	„	0,20
plumbea Rossm.	Transsylv.	0,10-20
v. cornea Ziegl.	„	0,10
praeclara Pfr.	Kreta	1—2
profuga Charp.	Graecia	0,30-40
pumila Ziegl.	Carn.	0,10-20
v. sejuncta A. Schm.	Germ.	0,20
v. succosa A. Schm.	Trans.	0,20
punctulata Küst.	Italia	0,10
regalis Parr.	Transsylv.	0,20
regina Küst.	Dalm.	0,30-40
regularis Parr.	„	0,30-40
robusta Küst.	„	0,30
v. minor	„	0,20
Rolphi Leach	Anglia	0,20-30
rugicollis Ziegl.	Hungar.	0,20-30
v. carissima Rossm.	„	0,30
v. maxima A. Schm.	„	0,20-30
v. oleata Rossm.	„	0,30
rugosa Drap.	Gallia	0,10-20
rupestris Friv.	Brussa	1,—
rupestris Friv.	Olymp.	1—2
satura Ziegl.	Dalm.	0,20-30
saxicola Parr.	Graecia	0,10-20
Schmidti Pfr.	Carn.	0,20-30
Schwerzenbachi Charp.	Brus.	0,20-30
semilamellata Mouss.	Cauc.	0,40-50
semirugata Ziegl.	Dalm.	0,20
v. pygmaea Ziegl.	„	0,20
v vibex Rossm.	„	0,20
septemplicata Phil.	Sicil.	0,20-30
serrulata Midd.	Caucas.	0,50-60
Sirki Parr.	Dalm.	0,50-60
solida Drap.	Gallia	0,10-20
soricata Pfr. v. bifilosa Blanc	Graecia	0,20
Spratti Pfr.	Kreta	1-1,50
spreta Friv.	Constant	0,40-50
Stentzi Rossm.	Carn.	0,10-20
v. cincta Brum.	„	0,10-20
straminicollis Parr.	Trans.	0,10-20
v. occidentalis	„	0,20
striata Pfr.	Kreta	0,40-50
strigata Pfr.	„	0,40
v. acuticosta Bttg.	„	0,50
v. centralis	„	0,50
strigillata Mühlf.	Dalm.	0,20

		Mk.
Strobeli Porro	Italia	0,20
strumosa Friv.	Brussa	0,20
Stussineri Bttg.	Thessal.	0,60-80
sublamellosa Bttg.	Kreta	0,60-80
v. oblitterata Bttg.	„	1,—
subvirginea Bttg. v. farcimen Bttg.	Kreta	0,80
succineata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
sulcosa Wagn.	„	0,20
v. diminuta Parr.	„	0,20
Syracusana Phil.	Sicil.	0,20-30
tenuicostata Pfr.	Kreta	0,50-60
v. mitis Bttg.	„	0,40-50
v. strictecostata Bttg.	„	0,40-50
teres Oliv.	„	0,50
v. hierapetrana Bttg.	„	0.40
v. phalanga Bttg.	„	0,60
v. f. minor	„	0.40
v. subcostata Bttg.	„	0,50
v. f. minor.	„	0,30-40
Thermopylarum Pfr.	Graecia	0,40-50
Thessalonica Friv. v. crassilabris Bttg.	Thessal.	0,40-50
v. spreta Friv.	Constant.	0,40-50
Tiesseae Bttg.	Graecia	0,40-50
tichobates Parr.	Dalm.	0,40-60
torticollis Oliv.	Kreta	1,50-2
troglodytes A. Schm. v. vexans Bttg.	„	0,40-50
Tschetschenica Bayer	Cauc.	0,30-40
tumida Ziegl.	Transsylv.	0,20-30
turgida Ziegl.	„	0,20-30
v. elongata Rossm.	Hungar.	0,30
turrita Pfr.	Graecia	0,20
umbilicata Bttg.	Dalm.	0,50-60
vallata Mouss.	Janina	0,30-50
varians Ziegl.	Germ.	0,10-20
v. diaphana Ziegl.	Carn.	0,10-20
venosa Bttg.	Kreta	1.—
ventricosa Drap.	Germ.	0,10-20
venusta A. Schm.	Graecia	0,30-40
vetusta Ziegl.	Carn.	0,20
v. festiva Küst.	Germ.	0,10-20
v. striolata Parr.	Transsylv.	0,20-30
Villae Mühlf.	Italia	0,40-50
virgata Jan.	„	0,20
v. affinis Phil.	Sicil.	0,20
virginea Pfr. v. leucoderma Bttg.	Kreta	0,50-60
Voithi Rossm.	Graecia	0,30
xanthostoma Bttg.	Kreta	0,60-80

Succinea.

		Mk.
elegans Risso	Germ.	0,20
v. Baudoniana Haz.	Hungar.	0,20-30
v. levantina Desh.	„	0,20-30
v. Piniana Haz.	„	0,20
Hungarica Haz.	„	0,20
v. hasta Haz.	„	0,20
Kobelti Haz.	„	0,20-30
lapponica Cless.	Suetia	0,30-40
lenta West.	„	0,20-30
longiscata Morl.	Gallia	0,20-30
oblonga Drap.	„	0,10-20
v. arenaria Bouch.	Germ.	0,20-30
v. elongata Cless.	Suetia	0,20-30
Pfeifferi Rossm.	Germ.	0,10-20
v. debilis Morl.	Carn.	0,20-30
v. recta Baud.	Germ.	0,20-30
putris L.	Hungar.	0,10
v. acuta Haz.	„	0,20
v. angusta Haz.	„	0,20
v. Clessiniana Haz.	„	0,20-30
v. fontana Haz.	„	0,20
v. grandis Haz.	„	0,30
v. Westerlundiana Haz.	„	0,20
Suecica Cless.	Anglia	0,20-30
Valcourtiana Bourg.	Gallia	0,20-30

Carychium.

		Mk.
minimum Müll.	Germ.	0,10
v. inflata	Kreta	0,20
striolatum Bourg.	Tirol	0,20
tridentatum Bourg.	Gallia	0,20

Zospeum.

		Mk.
alpestre Freyer	Carn.	0,50-60
costulatum Freyer	„	0,50-60
Freyeri Schm.	„	0,50-60
obesum Schm.	„	0,50-60
pulchellum Frauenf.	„	0,50-60
reticulatum Hauffen	„	0,50-60
Schmidti Frauenf.	„	0,40-50
spelaeum Rossm.	„	0,60-80

Acme.

		Mk.
Banatica Desh.	Transsylv.	0,60-80
cryptomena Folin	Gallia	0,50-60
gracilis Cless.	Carn	0,60-80
lineata Hartm.	Germ.	0,30-40
polita Hartm.	„	0,40-50
spectabilis Rossm.	Carn.	1.-1.50

Cyclostoma.

		Mk.
costulatum Ziegl.	Hungaria	0,20-30
elegans Müll.	Europ. mer.	0,10
ferrugineum Lam.	Balear.	0,20
mamillare Lam.	Algeria	0,20-30
Olivieri Roth	Syria	0,50-60
sulcatum Drap.	Sicil.	0,20
v. multisulcatum Pott	„	0,30

Pomatias.

		Mk.
apricus Mouss.	Gallia	0,20-30
auritus Ziegl.	Dalm.	0,20
Canestrinii Adami	Italia	0,30-40
cinerascens Rossm.	Dalm.	0,20-30
Croaticus Zeleb.	Croatia	0,20
gracilis Küst.	Dalm.	0,20-30
Hellenicus Bourg.	Graecia	0,40-50
Henricae Strobel	Tirol	0,10-20
Hidalgoi Crosse	Hispan.	0,30
Hirzi Stoss.	Croatia	0,20-30
Hispanicus Bourg.	„	0,40
Lapurdensis Folin.	Gallia	0,30-40
nanus Westl.	Croatien	0,20-30
obscurus Drap.	Gallia	0,20
patulus Drap.	Carn.	0,10
Philippianus Gredl.	Italia	0,30-40
Pinianus Bourg.	„	0,20-30
plumbeus Westl.	Carn.	0,20
scalarinus Villa	Dalm.	0,20-30
septemspiralis Raz.	Carn.	0,10
v. Heydenianus Cless.	„	0,10-20
tesselatus Rossm.	Graecia	0,20-30
Vallae Stoss.	Italia	0,20

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.